

嬰

童

百

問

嬰童百問卷之七

熱吐 第六十一問

小兒秋夏伏暑多有熱吐何以別之或有黃涎頭額溫五心熱小便赤而少或唇乾而煩渴先令乳母服香薷散五苓散兒服竹茹湯五苓散熱甚者大柴胡湯去大黃服或小柴胡湯亦可熱極者可服大承氣湯其效如神玉露散亦可服

香薷散

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲霍亂者

由飽食豚膾復啖乳酪海陸百品無所不食  
飲寒漿眠臥冷席風冷之氣傷于脾胃諸食結  
而不消陰陽二氣壅滯不得流行陽氣欲降陰  
氣欲升陰陽交錯變成吐利不已臟腑昏亂榮  
衛俱虛冷搏于筋令轉筋宜服此劑大有神效

厚朴

一兩  
薑炒

香薷

一兩

白扁豆

一兩半  
炒黃

右咬咀每服三錢水一盞酒半盞同煎七  
去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷  
則速效也煎時不得犯鐵器慢火煎之兼治

時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩燥四載逆冷汗  
出如雨兩脚轉筋疼痛不可忍。者須井中沈令  
極冷頓服之乃有神效。

### 五苓散

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾  
煩渴引飲或水入即吐或小便不利及汗出表  
解煩渴不止又治霍亂吐利燥渴飲水

澤瀉

二兩

猪苓

半兩

白朮

半兩

茯苓

半兩

桂

一兩

右爲細末。每服二錢。熱湯調下。不拘時服。訖多  
飲熱湯。有汗出卽愈。又治瘧熱在裏。身發黃疸。  
濃煎茵陳湯下。食前服。疸病發渴。及中暑引飲  
亦可用水調服。如發虛浮腫。加綿黃芪人參末  
少許。

竹茹湯

治胃受邪熱。心煩喜冷。

葛根

半兩

半夏

一兩  
薑製

甘艸

四錢

右咬咀。每服三錢。水一盞。入竹茹棗許大薑五  
片煎至七分。不拘時服。

大柴胡湯

治傷寒十餘日。邪氣結在裏。往來寒熱。大便秘澁。腹滿脹痛。譫語。心中痞硬。飲食不下。或不大便五六日。繞臍刺痛。時發煩躁。及汗後如瘧。日晚發熱。兼臍實。脈有力者可服。

柴胡

去芦 八錢 黃芩 三錢

赤芍藥

三錢 枳實 去穢 炒 三錢

半夏

湯泡七次 切片 焙乾 一錢半

右剉散。薑棗煎。加減服之。欲下加大黃半兩。

大承氣湯

治剛症胸滿內實。口噤咬牙。大熱發渴。大便秘

大黃

半兩

芒硝

半兩

厚朴

一兩

枳實

二枚

右剉散。每服三錢。薑三片煎服。

### 玉露散

涼心經。解諸熱。治口燥咽乾。煩渴躁啼。小便澀。

寒水石

二兩

石膏

二兩

甘艸

三錢

右爲末。每服半錢。門冬湯調下。湯使隨意。加辰砂。金箔。名桃紅散。亦治急驚。入梔子仁。名金蓮散。加滑石半兩。名玉真散。

寒冷嘔吐噦逆

第六十二問

小兒感受風冷。或食生冷瓜果過多。胃口停寒。以致吐食吐乳。並用理中湯主之。或釀乳法消乳丸異攻散。香朴散。茯苓半夏湯。二陳湯。人參散。麝沉散。俱可服。

理中丸

治脾胃不和中寒。上衝胸膈。心腹逆滿。疔痛。痰逆。惡心嘔吐。心下虛煩。痞滿。膈塞不通。飲食減少。短氣。羸困。溫中逐水止汗。去溼泄瀉。注下。水



穀不分。腹中雷鳴。傷寒時氣裏寒外熱。霍亂吐利。手足厥冷。胃痺心痛。逆氣短氣。寒多不飲水而吐。

人參

去芦 三兩

白朮

二兩

乾薑

炮 三兩

甘艸

炒 減 十

右咬咀。每服三錢。水一盞。煎六分。去滓。帶熱服。空心食前。或研細末。白湯調下。腹痛者。加人參一兩半。寒多加乾薑一兩半。渴者加白朮一兩半。臍上築者。腎氣動也。去白朮加桂四兩。吐多者。去朮加生薑三兩。下多者。還用朮。悸者加茯苓。

苓二兩或四肢拘急腹滿下利轉筋者去朮加  
附子一个生用朮之蜜丸如雞子黃大名理中  
丸又名調中丸治厥陰臟寒虢上入鬲吐長蟲  
或胃中虛冷因發汗致吐蟲先服理中丸或加  
枳實茯苓蜜丸治傷寒結胃欲絕心鬲高起實  
滿作痛手不得近並用熱湯化下

### 釀乳法

治初生嬰兒以表用藥凡有胎熱症當令乳母  
服藥不可求效之速治法當釀乳令兒啣漸次

解之。百無一失。若遽以冷藥攻之。必損脾胃。加以嘔吐。必成大患。

澤瀉

二兩半

猪苓

去黑皮

赤茯苓

天花粉

各一兩

生地黃

二兩

山茵陳

甘艸

各一兩

右咬咀。每服五錢。水一盞。煎六分。食後捏却服。

### 消乳丸

治小兒乳哺飲食取冷過度。冷氣積于脾胃。胃爲水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣調和。則乳哺消化。脾傷于冷。則宿食不消。脉沉爲食不化。故

砂仁

炒半兩

橘皮

半兩

京三稜

半兩

蓬莪朮

半兩

神麴

炒半兩

麥蘖

炒半兩

香附子

炒兩

右爲末。麴糊丸。麻子大。食後白湯加減下。

異功散

治吐瀉不思飲食。溫中和氣及脾胃虛冷者。先與數服以正其氣。

人參

一兩

茯苓

一兩

白朮

一兩

甘艸

一兩

橘紅

一兩

木香

一兩

右剉散。每服二錢。一棗煎服。一方無木香。

香朴散

治嘔吐冷症

藿香葉

八分

陳皮

八分

厚朴

薑製八分

半夏

薑製六分

甘草

炙三分

右咬咀水一盞生薑二片棗子一个煎七分服

茯苓半夏湯

治諸嘔噦心下堅痞  
隔間有水痰眩悸

茯苓

二兩

半夏

五錢湯  
泡七次

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎六分服

二陳湯

治痰飲為患嘔吐惡心或頭眩心悸或  
中脘不快或為寒熱或因生冷傷脾

半夏

湯泡五錢

橘紅

五錢

白茯苓

三錢

甘草

炙半錢

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片烏梅一个

煎至七分去滓溫服

人參散

治小兒臟腑冷。若纔嘔乳食。卽又吐出。或因嘔  
嘔乳。爲驚觸犯。令小兒外症面唇青黑。手足心  
熱。口多清涎。吐逆不住。或作瀉候。青黃紫白。或  
如鼻涕雞子清者。並宜服之。

人參

半兩  
去芦

白朮

半兩  
炒

白茯苓

半兩

沉香

半兩

烏藥

半兩

甘艸

炙半兩

右爲細末。以瓶貯之。遇小兒有前項形症。半歲  
一字。二三歲半錢。大者一錢。煎棗子米飲調下。

或陳紫蘇湯亦可或吐瀉并作煎丁香湯下。陳

皮湯尤妙。

麝香散

又名沉香散。生胃氣止吐瀉。

茯苓

二錢

沉香

一錢

丁香

一錢

木香

一錢

藿香

一錢

厚朴

製一錢

甘草

多一錢

麝香

一錢

右爲細末。每服一錢米飲調下。

霍亂吐瀉

第六十二問

小兒吐瀉。有身溫者。有身熱者。有身涼者。有吐瀉成  
驚風者。有夏秋傷暑吐瀉者。有初生三日內吐瀉者。  
仲景云。小兒初生三日內吐瀉。壯熱不思乳食。大便秘  
青白。乳食不消。或白色是傷。當下之。後和胃。仍用白  
餅子。和胃用益黃散主之。三日以後。至十日吐瀉。身  
溫涼。不思乳食。大便秘青白色。乳食不消。此上實下虛  
也。用益黃散加減治之。又傷風吐瀉。身溫。乍涼乍熱。  
多氣。兼大便秘黃白色。嘔吐乳食不消。時時咳嗽。更有



五臟兼見症。當服入臟君臣藥。先大青膏。後益黃散。主之。又吐瀉身熱。多睡。能食乳。飲水不止。吐痰。大便秘。黃水。皆爲胃虛熱渴。吐瀉也。當生胃中津液。以止其渴。止後用發散藥。止渴多。服白朮散。發散大青膏。釣藤飲主之。又吐瀉身涼。吐沫。瀉青白色。悶亂不渴。嘔氣長出。氣睡露睛。此傷風荏苒輕怯。因成吐瀉。當補脾後發散。補脾益黃散。發散大青膏。釣藤飲。夏至後吐瀉。身壯熱。熱症也。或因傷熱。乳食嘔吐不消。瀉深黃色。玉露散主之。五苓散亦佳。香薷散車前子散可。

選而用之。若面色青黃。知風熱在脾。髮直怕人。眼不  
合。是心中有毒涎。更胃逆風。精可服定命丹。

### 白餅子

治小兒夾食傷寒。其症發熱嘔吐。亦有肚疼者。  
暖氣辨得分曉。先用此藥一服。推下食積。却用  
平和藥發散調治。如惺惺散加減。參蘇飲皆可  
服。却不可服冷藥。

滑石

一錢

南星

一錢

半夏

一錢

輕粉

十錢

巴豆

水一升。煮乾。研細。膜用。

右三味搗羅爲末。入巴豆霜。次人輕粉。又研勻。却入餘藥末令勻。糯米飲丸如菉豆大。量小兒壯瘦虛實用藥。三歲已下。每服三丸至五丸。紫蘇湯空心下。忌熱物。若三五歲兒壯實者。不以此拘。如至二十九以利爲度。

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化

陳皮

去白一兩 丁香二錢 木香一兩

訶子

炮去核半兩

青皮

去穰半兩 甘草二錢 炙

若爲末。每服二錢水一盞煎三分。食前服。

大青膏

治傷風咳嗽痰喘  
左右并二三歲亦可用

天麻

一錢

白附子

半錢

蝎尾

半錢

硃砂

一分

青黛

一錢

天竺黃

一分

麝香

一字

烏蛇

酒浸焙乾半錢

右爲末。生蜜爲丸如芡實大。月中兒粳米大。同牛黃膏彈苛湯化下。五歲以上同甘露散服之。

白朮散

治小兒吐瀉

人參

二錢半

白茯苓

半兩

白朮

半兩炒

藿香葉

半兩

木香

二錢

甘草

一錢

乾葛

半兩渴者加至一兩

右以水每服三錢水煎熱甚發渴去木香。

釣藤飲

治吐利脾胃氣虛生風慢驚

釣藤鈎

三錢

蟬蛻

半兩

天麻

半兩

防風

半兩

蝎尾

半兩

人參

半兩

僵蠶

炒二錢

麻黃

去節二錢半

甘草

炙二錢半

川芎

二錢半

麝香

不拘多少

右剉

每服三錢

水

一盞

煎服

寒多加附子半錢

玉露丸

涼心經解諸熱治口燥咽乾煩渴躁啼小便不利

寒水石

一兩

石膏

一兩

甘艸

三錢

右爲末。蜜丸。桐子大。每服十九。白湯下。

五苓散

治霍亂吐瀉燥渴引飲小便不利或水入即吐及汗出表解煩渴不止並皆治之

澤瀉

二兩半

猪苓

一兩半

白朮

一兩半炒

白茯苓

一兩半

桂

一兩

右爲細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多

飲熱湯汗出卽愈又治瘧熱在裏身發黃疸濃

煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲亦

可用水調服小兒加日朮末少許如發虛加綿

黃芪人參末少許

香薷散

治霍亂吐瀉轉筋

香薷

一兩

白扁豆

一兩

厚朴

炒一兩

右剉每服三錢。水煎并中浸冷。連進二三服效。

車前子

治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲

白茯苓

一兩

猪苓

一兩

香薷

一兩

車前子

一兩

人參

五錢

右末。燈心湯調下。肚疼加芍藥。瀉不止加石蓮。

定命飲子

治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾風

生半夏

一兩

茯苓

一兩

木香

一兩

生薑

一兩切

右為末。每服半錢。薑棗煎湯調下。

理中湯

治霍亂吐利

人參

三兩  
去芦

白朮

三兩  
炒

乾薑

三兩  
炮

甘艸

一兩  
半炙

右咬咀每服三錢水一鍾煎六分去滓帶熱服

空心食前或研細末白湯調下腹痛者加人參

一兩半寒多加乾薑一兩半渴者加白朮一兩

半臍上築者腎氣動也去白朮加桂四兩吐多

者去朮加生薑三兩下多者還用朮悸者加茯

苓二兩或四肢拘急腹滿下利轉筋者去朮加

附子一个生用末之蜜丸如雞子黃大各理中

丸又名調中丸治厥陰臟寒虵上人鬲吐長蟲



亡胃中虛冷西發汗故吐蟲先服理中丸或加枳實茯苓蜜丸治傷寒結胸欲絕心隔高起實

滿作痛手不得近竝用熱湯化下

不換金正氣散

治山嵐瘴氣寒熱往來五隔氣嘔霍亂吐瀉臟腑虛寒

厚朴

去皮薑汁炒一兩

藿香

一兩去土

陳皮

一兩去白

半夏

皂莢白礬薑汁同煮一兩

甘草

炙一兩

蒼朮

米泔浸一兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片大棗二枚

煎七分絞去滓食前帶熱服

二順散

治伏熱中皆霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤色腹血肚疼

猪苓 一兩 澤瀉 一兩 茯苓 一兩 白朮 一兩

甘艸 炙一兩 桂 一兩 乾薑 一兩 杏仁 一兩 去皮尖

右爲末。每服半錢。或一錢。新汲水調下。

### 又釀乳法

治胃虛吐瀉。睡中吐舌。搖頭吐乳。作腥氣。額上

汗流。多驚啼哭。面黃。凡有此疾。宜暫斷乳。今胃

乾饑。甚用藥。令乳母釀乳。

人參 一兩 木香 一兩 藿香 一兩 沉香 一兩

陳皮 一兩 神麴 一兩 麥芽 一兩 丁香 半兩

右咬咀每服四錢薑三片紫蘇十葉棗三個  
乳母食後捏去妳汁盡方服半盞許臥少時却  
與兒乳

魘病 第六十四問

巢氏云小兒被魘病者婦人懷胎孕有鬼神導其腹中胎嫉妬小兒致合此病其狀微微下利寒熱往來毛髮鬚髮情思不悅也千金論魘者小兒鬼也凡婦人先有小兒未能行而母繼有胎維令兒漸漸羸瘦骨立毛髮稀黃不長時作壯熱大便不勻乃魘病也又曰繼病法當用紫霜丸下魘乳以益黃散補之令小兒斷乳卽安消乳丸異攻散亦妙劑也其或他婦人有妊而抱他人嬰孩者亦有此症同此治法有熱

者龍膽湯

紫霜九

治小兒因母復胎致有寒熱羸瘦口瘡病

代赭石

般醋淬七  
火一兩

赤石脂

一  
雨杏仁五十个  
去皮尖

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏却入代

赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸如粟米大一

歲服五丸米飲吞下一二百日內兒三九乳汁

下更宜量其虛實加減微利爲度此藥兼治驚

痰諸疾雖下不致虛人

益黃散

治小兒吐瀉腹虛不食米穀不化困倦  
少泄腸夜起并疳虛盜汗黃瘦

陳皮

去白一兩

丁香

二錢一分用木香

訶子

炮去油半兩

青皮

去穢半兩

甘草

炙半兩

右爲末每服二錢水一盞煎三分食前服

消乳丸

治小兒乳哺飲食取冷過度冷氣積于脾胃胃爲木穀之海被乳所傷故成此症

砂仁

半兩

橘皮

半兩

三稜

炒半兩

蓬朮

炒半兩

神麴

炒半兩

麥芽

炒半兩

香附子

炒一兩

右爲末麴糊丸麻子大食後白湯送下。

異功散

治吐瀉不思飲食溫中和氣及脾胃虛冷者先與數服以正其氣然後再用他藥

人參

一兩

白茯苓

一兩

白朮

炒一兩

甘草

炙一兩

橘紅 一兩 木香 一兩

右剉散每服二錢薑棗煎服一方去木香

龍膽湯

活小兒因乳母復受胎孕今見漸漸消瘦骨立毛豎竟成瘵疾名曰癰病此方大效

龍膽艸

半兩

釣藤

半兩

柴胡

半兩

黃芩

半兩

白芍藥

半兩

茯苓

半兩

甘艸

半兩

蜣螂

二枚去翅足炙

大黃

煨二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎半盞服之以漸加

服得利即止直指方加防風麥門冬以導心熱

黃芩減半北棗煎服去蜣螂蟲亦可

瀉利 第六十五問

千金論小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下利或赤白滯起數去小兒腹脹痛極壯熱氣脉洪大或急熱數者宜調中湯下之熱便歇利亦瘥也但壯熱不吐下者亦宜服之又夏月秋初急有暴寒折于感熱無可發散客搏肌中發外則爲瘧發于內則爲痢內外俱發則瘧痢俱作皆由榮衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客于腸胃又因飲食所傷冷熱不調夾冷則白夾熱則赤



冷熱交攻則膿血相雜亦因沉積所作赤痢積熱白痢積冷赤白相雜冷熱之積若脾胃氣虛不能消化水穀則糟粕不聚或春間解脫風冷所傷腸胃虛弱卒被風寒所折便爲下利多矣經云春傷于風夏必飧泄故也調中湯去大黃加枳殼更利不止則加黃連治之其暴下利者車前子末之米飲調下亦效暑月用五苓散車前子散燈心湯調服潑火散加減服之陽陽明合病者必下利葛根湯主之嘔者加半夏

通散亦可服

調中湯

治夏末秋初忽有暴六折于感暑熱渴者  
四肢則壯熱頭暈其傷于胃則下利赤白

大黃

七錢半

桔梗

半兩

藥本

半兩

茯苓

半兩

甘草

半兩

乾葛

半兩

黃芩

半兩

芍藥

半兩

白朮

半兩炒

右咬咀白水煎量大小加減服得快氣利壯熱

便歇去大黃加黃連枳殼止利尤妙或加地榆

或加當歸皆可感風加荆芥

五苓散

治傷寒溫熱病發熱口渴咽乾煩渴飲水  
或水大即吐或小便不利及治吐瀉下利

澤瀉

二兩半

猪苓

一兩半

白朮

一兩半炒

茯苓

一兩半

肉桂

一兩

右爲細末每服二錢白湯調下不拘時服訖多  
飲熱湯有汗出卽愈又治痧熱在裏身發黃疸  
濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲  
亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛加  
綿黃芪人參末少許

車前子散

治暑月伏熱霍亂吐瀉煩悶引飲

白茯苓

一兩

諸苓

一兩

香薷

一兩

車前子

一兩

人參

半兩

右爲細末。每服一錢。燈心泡湯調下。腹痛加芍藥。瀉不止。加石蓮。

潑火散

治中暑煩燥發渴口乾及治血痢

青皮

去白一兩

赤芍藥

一兩

黃連

去對一兩

地榆

一兩

右爲細末。冷水調下一錢。如血熱妄行加甘草。

葛根湯

治太陽病項強兀兀惡風無汗不惡寒

葛根

四兩

麻黃

三兩

肉桂

一兩

甘草

一兩

白芍藥

二兩

右剉。每服五錢。水一盞。生薑三片。棗子二枚。同

煎至七分去滓服取微汗。

四逆散

治少陰病其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者

甘草

炙一兩

枳實

炒一兩

柴胡

一兩

白芍藥

炒一兩

右搗篩爲細末水飲調下二錢日進三服○如

咳者加五味子乾薑各半兩下利悸者加桂半

兩小便不利者加茯苓半兩泄利下重先濃煎

薤白湯內藥末三錢匕再煮一二沸溫服。

冷瀉 第六十六問

湯氏云此乃脾虛受冷致令水穀不化泄瀉注下。仲陽云小兒不能食乳瀉褐水身冷無陽也當 脾益黃散主之。古今不同當依加減法用之始為穩當。冷積瀉沒石子丸極效。人參散理中湯加減服尤佳。更加肉豆蔻則止來復丹不換金正氣散皆可。觀音散銀白散加減調治乃平和之劑也。

益黃散

治小兒受寒瀉利青白脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并治涎唾流頰下

陳皮

去白一兩 丁香二錢 一方用木香

訶子

炮去核五錢

青皮

去穢五錢

甘草

炙五錢

右剉每服二錢水一盞煎至七分去滓食前服

### 沒石子丸

治小兒嬰孩先因冷瀉或作赤白利候久而變作諸般異色不止一端外症面或青或白唇舌乾焦手微冷渾身溫壯肚內刺痛啼叫睡臥不安若有是候當服沒石子丸

沒石子

錢

木香

一兩

黃連

一兩

當歸

一兩

青皮

一錢

石五件爲末。阿膠一錢。酒一盞。浸化。人麴少。須令勻。煮糊爲丸。如粟米大。一二歲兒服如椒目大者。四五六歲兒服。每服五十九。赤痢甘艸湯下。白痢乾薑湯下。或用五倍子湯下。

一方用沒石子一個。白豆蔻五個。訶子肉二個。木香黃連各一錢爲末。粳米糊丸。麻子大。每服十五丸。米飲下。

### 人參散

治小兒臟腑冷。若纔喫乳食。卽又吐出。或因纔



喫乳爲驚所觸。令小兒外症面唇青白。手足心熱。口多清涎。吐逆不住。或作瀉。候青黃紫白。或如鼻涕。雞子清者。或乳食不化。宜服之。

人參

牛兩

白朮

牛兩

茯苓

牛兩

沉香

牛兩

烏藥

牛兩

甘艸

牛兩

右爲細末。以盒收之。遇小兒有前項形症。半歲一字。二三歲半錢。大者一錢。煎棗子米飲調下。

理中湯

治小兒脾胃虛冷。

人參

去芦

白朮

炒三

乾薑

炮三

甘艸

半兩

右剉每服三錢水煎服

來復丹

治小兒虛寒洩利詳見十六問

硝石

硫黃

太陰玄精石

各一兩

陳皮

五靈脂

青皮

各二兩

右方修製及服法俱詳十六問中茲不多贅

不換金正氣散

治山嵐瘴氣寒熱往來五瀉氣噎霍亂吐瀉臍虛寒

厚朴

去皮薑製

藿香

去土

陳皮

去白

半夏

皂莢白礬薑汁

同煮

蒼朮

米泔浸炒

甘草

炙各等分

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗子二个

煎去滓食前帶熱服。

觀音散

治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳食久成羸弱太抵脾虛則瀉利嘔吐

石蓮肉

兩

人參

一兩

神麴

炒半兩

茯苓

半兩

甘草

炙半兩

木香

炮半兩

綿黃芪

半兩

白扁豆

炒去皮

白芷

各三錢

右為末每服一錢水一盞棗一枚藿香三葉煎

四分去滓溫服大小加減

銀白散

治冷瀉黃青壯胃氣

糯米

炒二兩

扁豆

炒二兩

藿香

兩

白朮

炒一兩

丁香

錢

甘艸

三錢  
炙

右爲末。紫蘇米飲調下。加天麻砂仁白茯苓快  
脚正色。直指方加炮白附全蝎木香石蓮肉薑  
一片煎

藿香散

治小兒臟腑不調。作瀉青黃黑白乳食不消。糞  
中有凍如雞子青。兼暴瀉如水。其症腹痛微熱。  
面唇黃白。若慢驚。或偏墜紅腫內釣。紫蘇湯調  
下三五服。

陳皮

半兩

藿香葉

半兩

厚朴

襲半兩

枳殼

炒半兩

甘艸

炙半兩

右爲末。紫蘇湯下三錢。糞中有黃白凍子。木瓜

并白梅去鹽煎湯下。如痢止用棗子煎湯下。大

能和胃進乳食。此是小兒常服之藥。

朱君輔方

熱瀉

第六十七

湯氏云。小兒熱瀉者。大便黃而赤。或有沫。乃臟中有積。或因乳母好飲酒。或嗜熱物。或生下傷濕。蘊熱。醫者不明。但用豆蔻訶子等藥。服之如水澆石。既不識其症。故不辨其冷熱。用藥又不得其法。焉得取效。此症當以小便赤少。口乾煩燥爲驗。治法當用錢氏白朮散。去木香。用之。五苓散。去桂。亦可。服其熱甚者。四逆散。大柴胡湯。去大黃。服之。殊驗也。更用黃連。尤等劑。亦佳。調中湯。去大黃。加黃連。枳殼。如夾熱而瀉。太

陽與少陽合病自下利者與黃芩湯嘔者加半夏也  
又有挾熱瀉利而小便秘澀赤甚者四順清涼散主  
之。

白朮散 治小兒熱瀉小便赤少口乾煩渴

人參 二錢半 白茯苓 半兩 白朮 半兩 藿香葉 半兩

木香 二錢 甘草 一錢 乾葛 半兩 加至一兩

右剉散水一盞煎七分食前服發熱甚渴者去

木香肚痛加芍藥

大柴胡湯 治小兒挾熱瀉利

桑根

八錢

黃芩

三錢

赤芍藥

半夏

湯泡錢半

枳實

去穢麤炒半錢

右劉散薑棗煎加減服之欲下加大黃

五苓散

治傷寒濕熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾飲水或水人即吐及受熱瀉利之症

澤瀉

二兩

猪苓

一兩

白朮

一兩

茯苓

一兩

桂 一兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多

飲熱湯有汗出即愈又治瘧熱在裏身發黃疸

濃煎茵陳湯下食前服疸病發渴及中暑引飲



亦可用水調服。小兒加白朮末少許。如發虛加

綿黃芪人參末少許

黃連丸 治小兒挾熱瀉利

黃連 半兩淨洗猪膽汁浸二夜曬乾 瓜蒌根 半兩 烏梅肉 半兩

杏仁 泡去皮尖及雙仁者半兩 石蓮子 半兩

右為末。牛膽汁浸。糯米糊丸。麻子大。每十五丸。煎

烏梅薑蜜湯下

四逆散 治少陰病其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重又治挾熱洩瀉尿赤

甘草 一兩 枳實 一兩 柴胡 一兩 白芍藥 炒一兩

如咳者加五味子乾薑各半兩下利悸者加桂  
半兩小便不利者加茯苓半兩泄利下重先濃  
煎薤白湯內藥末三錢七再煮一二沸溫服。

右檇篩爲細末水飲調下二錢日三服

調中湯

治夏月秋初忽有暴寒折于盛暑熱結于  
四肢則壯熱頭疼寒傷于胃則下利赤白

大黃

七錢半

桔梗

半兩

藁本

半兩

茯苓

半兩

甘草

半兩

葛根

半兩

黃芩

半兩

白芍藥

半兩炒

白朮

半兩

右咬咀白水煎量大小加減服得快氣利壯

便歇去大黃加黃連枳殼止利尤妙或加地榆  
或加當歸皆可。感風加荊芥秋宜下。當用大黃  
疎利

黃芩湯

治下利而頭痛胸滿口苦咽乾或往來寒熱而嘔其脈浮大而弦專治協熱而利者

黃芩

一兩半炒

白芍藥

一兩炒

甘草

炙一兩

右咬咀。每服三錢。棗子一個。水一盞煎至七分。  
去滓溫服。嘔者加製半夏生薑汁。

四順清涼飲

治小兒血脈壅實。臟腑生熱。煩赤多渴。口心煩。

燥睡臥不安四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失  
度令兒血氣不順脾胃不調小便少大便澁或  
溫壯連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又  
治風熱結核頭面瘡癰目赤咽痛瘡疹毒一切  
壅滯並宜服之治挾熱瀉不止加木香用煨大  
黃

赤芍藥

一兩

當歸

一兩

甘州

一兩

大黃

一兩

右剉散三歲已上每服二錢水一盞煎至七分  
作兩服欲利小便用赤芍藥虛熱加甘草不利

減大黃。冒風邪。加去節麻黃。中風體強。眼睛上視。加獨活。量兒大小。虛實加減。微漉利爲度。可加荊芥。更十四問內有加味清涼飲子。可詳症通用。

傷食瀉

第六十八問

湯氏云。凡此瀉不宜便補。先用消食藥。或用紫霜丸取其積盡。然後可補。經云。食瀉重當取。疴虛用補。虛治食瀉。與香橘餅子。加減觀音散。調中湯散。以意加減。凡傷食瀉。不可卽止。宜節飲食。當用進食丸。取下食積。令盡。次以錢氏加減芩黃散。只一服可止。此乃切要治法。然後異功散。四君子湯。調理必取全安。有腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。如冷症積釀瀉。用香朴散止之。白朮散以和氣調胃。調中散保安丸。

能止傷食瀉。感應丸。沉香煎。三稜煎。皆可服。

### 紫霜丸

治變蒸發熱不解。并傷寒溫壯。汗后不歇。胸中有痰癖。乳哺不進。乳則吐現。先寒后熱者。又治食積。乳哺失節。宿滯不化。或因食而發癇。大便秘臭。並宜服之。

代赭石

煅醋淬七次一兩

赤石脂

一兩

巴豆

三十枚去皮膜心出油

杏仁

五十枚去尖

右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏。却入代

補石脂大入以湯浸蒸餅爲丸如粟米  
歲服五九米飲吞下。一二百日內兒三九乳  
下。更宜量其虛實加減微利爲度。此藥兼治  
痰諸疾雖下不致虛人。

香橘餅 治傷冷瀉利

木香 一錢 青皮 一錢 陳皮 一錢 厚朴 薑汁炒

神麴 半兩 麥芽 半兩

右爲末蜜丸爲餅紫蘇米飲調下。

金蝎觀音散 止吐瀉截虛風



黃芪

蜜炙一兩

人參

去芦一兩

木香

一兩

大粉艸

炙一兩

石蓮

去心一兩

扁豆

炒黃一兩

白芷

七錢

白茯苓

去皮一兩

全蝎

七錢

羌活

入錢

防風

去芦八錢

天麻

八錢

右剉每服二錢水一盞煎至七分服加薑棗煎

### 調中散

治傷食瀉凡此瀉不宜便補先用食藥或紫霜  
丸取其積盡然後可補經云食瀉重當取疳  
用補虛良醫明妙理何慮疾難除

人參

去芦一兩

白茯苓

一兩

白朮

炒一兩

木香

一兩

乾薑

炮兩

藿香葉

兩

香附子

炒去毛

砂仁

炒一兩

甘草

炙一兩

丁香

一兩

右為末。每服一錢。薑棗湯。平肚痛白湯。大小以意加減。

### 進食丸

治乳食不消。心腹脹滿。壯熱喘粗。嘔吐痰逆。腸鳴洩瀉。米穀不化。或下利赤白。腹痛后重。及食癰乳癖。疰氣痞結。並皆治之。小兒胸膈熱實。腹內有留飲。致令榮衛痞塞。臟腑之氣。不得宣通。

其病腹內氣結脹滿或壯熱是凡有此疾當疎利大便秘結散氣宜常服之

巴豆霜

錢一 當歸 五錢 米泔浸 一宿 晒乾炒

硃砂

五錢

代赭石

煅醋淬七次 五錢 枳殼 炒 五錢

木香

五錢

麝香

一分

右爲末麪糊爲丸如麻子大一歲兒一九溫米飲下更量虛實加減食後服治食積發熱羸瘦肚大青筋疳積肚疼嘔露

與功散

治吐瀉不思飲食一匙中和氣反脾胃虛冷者先與麝服以正其氣

人參

一兩

茯苓

一兩

白朮

一兩

甘艸

一兩

橘紅

一兩

木香

一兩

右剉散每服二錢薑棗煎服一方去木香

四君子湯

治榮衛俱虛臟腑怯弱心腹脹滿全不思食腸鳴洩瀉嘔吐逆

人參

去芦

茯苓

去皮

甘草

炙

白朮

炒

右為末每服二錢水一盞煎七分通口服不拘

時鹽少許白湯點服溫和脾胃進益飲食辟寒

邪瘴霧氣

益黃散

治小兒吐瀉脾虛不食米穀不化困倦力少滑腸夜起并治涎唾流頤下名曰滯頤

陳皮

去白一兩丁香二錢一方

訶子

炮去核半兩

青皮

去穢半兩甘草炙半兩

右爲末。每服二錢。水煎三分。食前服。

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解後胃中不和心下痞硬脇下有木氣腹中雷鳴下利者

黃連

半兩甘草一兩人參一兩

乾薑

半兩

黃芩

半兩炙甘草一兩湯

右剉散。每服三錢。水一盞。生薑三片。棗一枚。煎

七分。去滓溫服。

香朴散

治嘔吐洩瀉

藿香葉

七錢

陳皮

去白七錢

厚朴

去粗製七錢

半夏

湯洗七次一兩

甘草

炙一錢

右剉每服三錢水一盞薑五片棗一枚同煎加

瀉甚加水香肉豆蔻

保安丸

治小兒瀉瀉傷食瀉

香附子

一兩

白薑

炮半兩

青皮

去穢半兩

陳皮

去白半兩

三稜

炮半兩

蓬朮

炮半兩

甘草

炙半兩

砂仁

炒一兩

右爲末麥蘖麩糊丸棗豆大每服三丸白湯下

沉香煎

治脾氣冷積

乳香 一錢 沉香 一錢 丁香 一錢 杏仁 炒一錢

百草霜 一錢 木香 一錢 肉豆蔻 一錢 巴豆 十四粒 去油

右爲末。酒煮蠟和丸。菜豆大。每服三五丸。淡生薑湯送下。應患肚痛不止。服之效。以通爲度。

三稜丸 治小兒停積腹脹滿 乾噎惡心食不人食

三稜 一兩 木香 一兩 神麴 炒一兩 陳皮 去白一兩

半夏 一兩 丁香 半兩 桂 半兩

右爲末。麴糊丸。如黃米大。二十九。乳食後溫生薑湯下。

薑湯下。

杏霜丸

治

見食積作瀉并痢症

杏仁

三兩去皮尖麤炒

巴豆

一兩去皮殺油炒焦却入杏仁同炒

黃蠟

二兩酒煮綿濾

百艸霜

炒為末二兩用油六錢炒勻

右將杏仁巴豆研極細却入百艸霜令勻溶蠟

和丸如棗豆大赤痢甘艸湯白痢生薑湯先進

三四服腹脹者十餘服效驗如神



驚瀉 第六十九回

仲陽云。慢驚病後。或吐瀉胃虛。或氣弱。因驚。眼白如淡墨。下糞青黃。此瀉合溫補。至聖保命丹。釣藤飲主之。或乳隨糞下。消乳丸進食。九主之。或微渴。心脾喘燥。狂熱。此瀉尤難治。辰砂五苓散主之。冷者定命飲。子主之後。與溫驚朱君散。睡驚太乙丹。

至聖保命丹

治小兒胎驚。內吊。腹肚緊硬。眠睡不安。夜多啼哭。及治急慢驚風。眼目上視。手足抽掣。不省人。

事悉皆主之。冷症用此。

全蝎

十四个 去毒

防風

二錢

礞石

炒去絲 紫二錢

天麻

二錢

南星

炮二錢

白附子

二錢

麝香

五分

金箔

十片

蟬蛻

二錢

硃砂

一錢

有熱症加

牛黃

一分

冰片

一分

礪砂

一錢

右爲末。粳米糊丸。每兩作四十丸。常服鎮心安。

神化痰除一切驚風諸症。湯臨時換。一方加人。

參白茯苓各二錢。

釣藤飲

治小兒夜啼。乃臟冷也。陰盛于夜則冷動。冷動則為陰極。發躁寒盛作疼。所以夜啼不歇也。釣藤散主之。治驚啼加蟬蛻防風天麻。前十六問有釣藤散。又二十問蟬蛻釣藤散可兼看對用。

釣藤鈎一錢 茯神一錢 川芎一錢 當歸一錢

茯苓一錢 木香一錢 甘草一錢 白芍藥一錢

右為末。每服一錢。薑棗略煎服。其或心熱而煩。啼必有臉紅舌白小便赤澀之候。釣藤飲去木香加硃砂末一錢。研和。每服一錢。木通湯調下。

或剉散煎服。

消乳丸

溫中快膈止嘔吐消乳食  
脈沉者傷食不化故也

香附

炒一兩

甘艸

炙半兩

陳皮

去白半兩

縮砂仁

一兩

神麴

炒一兩

麥蘖

炒一兩

右爲末。泡雪糕丸如黍米大。七歲以上菜豆大。

三十九。食後薑湯下。○治百晬內嘔吐乳汁。或

大便秘色。用乳汁一盞。入丁香十粒。去白陳皮

一錢。于器內同煮三小沸。去丁香。陳皮。稍熱。兒飢

時服。

進食丸

治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腹  
鳴泄瀉米穀不化或下利赤白腹痛后重及食  
廢乳癰疰氣痞結並皆治之小兒胸膈熱實腹  
內有留飲致令榮衛痞塞臟腑之氣不得宣通  
其癰腹內氣結脹滿或壯熱是凡有此疾當疎  
利大便破結散氣宜常服之

巴霜

一錢二分

當歸

五錢

硃砂

五錢

代赭石

五錢

枳殼

炒五錢

木香

五錢

麝香

少許

右爲末。麩糊爲丸如麻子大。一歲兒一九。溫米飲下。更量虛實加減。食後服。治食積發熱羸瘦。肚大青筋。疳積肚疼。嘔露。

辰砂五苓散 治霍亂吐瀉。燥渴。飲水。小便不利。

澤瀉 二兩 官桂 一兩 猪苓 一兩 白茯苓 一兩

白朮 一兩 辰砂 一兩

右爲細末。每服一錢。白湯調服。燥渴新水調下。大小以意加減。不拘時。

定命飲子 治慢驚吐瀉。困重。欲傳慢脾通用。

圓白半夏

錢生二

茯苓

錢二

木香

錢二

老生薑

切片日乾二錢

白朮

錢炒二

甘草

錢炙一

天麻

半二錢

右剉散每服二錢薑微泡湯調下。

朱君散

治吐瀉后有此症并糞清者宜服之

人參

去芦一兩

白朮

錢炒一

白茯苓

錢一兩

甘州

錢炙一

辰砂

水飛半兩

燈心

錢三

釣藤

錢半兩

麝香

錢半

右爲細末每服一錢用白湯調下不拘時服。

睡驚太乙丹

常服安神鎮驚止夜啼糞清

桔梗

炒一兩

藿香葉

半兩

扁豆

炒半兩

白芷

三錢

川芎

三錢

右爲末。煉蜜丸如芡實大。辰砂麝香爲衣。每服半丸。薄荷湯磨下。正糞色。棗湯下。夜啼燈心釣藤湯磨下。加白朮茯苓白芍藥尤妙。



諸色痢

第七十訓

湯氏云小兒痢候皆因飲食無節或餐果食肉物不知厭足乃脾胃尚弱不能尅化停積于臟故成痢也熱搏則赤風寒之氣入于腸胃致令津液凝滯則成白痢或夾青者有驚積或如魚腦肚中疼甚者大抵入痢但冷熱赤白藥性同治法不相遠矣又有赤白相雜者當先去其熱積須用大黃枳實朴消之劑以去其熱毒然後以黃連黃芩黃柏解而清之其熱自止疼自定此妙法也如痢不止則用地榆熟艾等劑

調理自然平復脾虛者不可輕用罌粟澁滯等劑必致危困須用沒石子黃連阿膠地榆以止之方爲盡其枳殼芍藥皆要藥也噤口痢不能食者石蓮散主之香脯散亦可冷痢如豆汁肚疼者胃風湯主之脾毒痢臟熱常服香連丸黃連香薷飲去桂五苓散茅根湯當歸芍藥枳殼地榆川芎等劑先與解毒退熱却與開胃進食分水穀寬腸定痛先與水浸丹祝局敗毒散地榆飲寬腸枳殼散有熱而利不止者三黃熟艾湯主之煩滯不通者神芩亦可用熱甚煩躁者

連解毒湯解之。潑火散亦效。

石蓮散

治小兒噤口痢。噤逆不食。止而復作。

蓮肉去心炒爲末。米飲下一錢。一方用山藥爲末。米飲調服亦妙。

香膈散

治小兒肚腹下痛。噤口不食。開喉合口。危急之症。

精豬肉

一兩薄批一片

膩粉一錢

右將肉于炭火上慢炙。旋鋪膩粉。炙令成脯。每以少許與喫。如未知噤。且放鼻間。自然要噤。此方治胃口有毒。至奇至妙。

胃風湯

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃。水穀不化。瀉瀉注下。腹脇虛滿。腸鳴疼痛。及腸胃溼毒。下如豆汁。或下瘀血。日夜無度。並宜服之。

白芍藥

炒

白朮

炒

肉桂

去粗皮

人參

去芦

當歸

去苗

白茯苓

去皮

川芎

各等分

右爲粗末。每服二錢。水一盞。粟米同煎七分。去滓。空心熱服。小兒量力加減。

香連丸

治濃積瀉亦治痢

黃連

一兩同吳茱萸炒去朱萸

木香

二錢

訶子肉

半兩

右爲末麩糊丸如麻子大空心米飲下三十九

黃連香薷飲

治暑熱所傷下痢赤色

香薷

一兩

扁豆

炒半兩

厚朴

薑炒半兩

黃連

薑汁炒半兩

右剉每服三錢水薑煎服

五苓散

治中濕下痢煩渴飲水

澤瀉

二兩

猪苓

一兩

白朮

一兩半炒

白茯苓

一兩半

桂

此味去之

石爲細末每服二錢熱湯調下。

茅花湯

治鼻衄不止吐血下血

茅花一大把。水三盞煎濃汁一盞分二服卽瘥。

無花根梗代之兼治血痢黑痢。

水浸丹

治瀉利先鋒之藥

黃丹

研細一兩

巴豆

廿五个去皮研細出油

右研勻。用黃蠟半兩溶化拌勻。量大小旋丸。水

浸吞下。湯使更臨病隨意用。一方黃丹一兩巴

豆四十九个。乳香二錢。麻油二錢。蠟半兩溶化

和丸。名頓止丹。又冷症加木香二錢半。

敗毒散

治傷寒時氣頭項強壯熱惡寒身微煩疼及寒熱咳嗽鼻寒聲重

人參

去芦一兩 茯苓

去皮一兩 甘艸

一兩

前胡

去苗一兩

川芎

一兩 羌活

去苗一兩 獨活

去苗一兩

桔梗

一兩

柴胡

去芦一兩 枳殼

水浸去穢麩炒黃一兩

右剉散每服二錢水一盞生薑薄荷各少許止

瀉痢用陳倉米煎粳米亦可。

地榆散

治瀉痢血痢

地榆

一兩

訶子

一兩

甘艸

一兩

右爲末鹽米湯調下有熱加黃芩。

芍藥栢皮丸

治一切惡痢瘧瘧腹痛血

芍藥

炒一兩

黃蘗

一兩

當歸

半兩

黃連

半兩

右爲末滴水丸如小豆大每服二三十丸白湯

下加枳殼

寬腸枳殼散

順氣止痢

甘草

六錢

枳殼

炒二兩

右爲細末每服一錢空心沸湯點服

三黃熟艾湯

治下利赤白及治傷寒四五日而大下熱利時作諸藥不效宜服此湯

黃芩

七錢

黃連

七錢

黃蘗

七錢

熟艾

半雞子大



右剉每服三錢小一盞煎六分去滓服

神芩丸 治小兒利

大黃 生 黃芩 各一兩 生牽牛末 一兩

滑石 四兩 黃連 薄荷葉 川芎 各半兩

右爲末滴水丸桐子大每服五十九溫水下食  
食後一方加蒲黃止血症用

黃連解毒湯 治熱痢如神之劑

黃連 三錢 黃柏 半兩 梔子 四個 黃芩 一兩

右剉每三錢水煎服

發火散

治血痢

青皮

去白一兩

赤芍藥

一兩

黃連

去須一兩

地榆

一兩

右為細末每服一錢冷水調下如畜熱而氣血

妄行加甘草。

湯氏異功丸

治渴止瀉消暑生滑夏月出路含化免吃冰炒

澤瀉

一兩二錢

猪苓

去皮七錢

桂

二錢半

茯苓

半兩

人參

半兩

白

半兩

辰砂

半兩

右末蜜丸芡實大燈心竹葉湯二三十九

聖藥百問卷之七